Voorzorg:

Zorg dat u een ongeparfumeerde PH-neutrale zeep, wattenstaafjes en/of wattenschijfjes en tissues in huis hebt voor de nazorg van de behandelde huid.

Bij een van de volgende aandoeningen mag permanente make-up **NIET** uitgevoerd worden!

- Hemofilie
- Herpes zoster in het gelaat (of ooit gehad)
- Herpes simplex oogontsteking
- Ichtiose
- Ehler-danlos syndroom
- Glaucoom
- Melanomen
- Keloïd
- Oogcomplicaties door diabetes
- Lipkanker
- Gebruik roaccutane (of afgelopen 6 maanden gebruikt)
- Jonger dan 16 jaar
- Lupus
- Ziekte van grave
- Chronische huidziekte

Houdt voordat u een permanente make-up behandeling ondergaat rekening met het volgende:

- Doe uw contactlenzen uit en draag een bril.
- 24 uur voor de behandeling geen alcohol drinken.
- 24 uur voor de behandeling geen drugs gebruiken.
- 24 uur voor de behandeling geen aspirine, ibuprofen, slikken (paracetamol mag wel).
- 24 uur voor de behandeling geen bloedverdunners gebruiken.
- Laat liever de waterproof mascara achterwege bij de eyeliner.
- Bij een behandeling aan de lippen, de lippen 2 dagen voor de behandeling scrubben met een peelingcrème of tandenborstel.
- Bij een behandeling aan de lippen 5 dagen voor de behandeling in beginnen te smeren met (een nieuwe tube) Zovirax.
- Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent raadpleeg deze dan alvorens de behandeling te laten uitvoeren.
- Indien u camouflage laat aanbrengen n.a.v. bestralings- of operatielittekens, raadpleeg dan eerst uw behandelend arts.
- Indien u chemotherapie moet ondergaan raadpleeg dan eerst uw oncoloog.